

Espèces communes à la zone Atlantique Nord Est

	Araignée de mer <i>Maja spp.</i> 16,5 cm (Vild* - Vile - Villab)		Bar <i>Dicentrarchus labrax</i> 42 cm (IVbc - Villadefgh - Villab) à partir d'avril
	Barbue <i>Scophthalmus rhombus</i> 41 cm (IIla - IV - Vilde)		Baudroie commune <i>Lophius piscatorius</i> 61 cm (IV - VII - Villabcd)
	Baudroie rousse <i>Lophius budegassa</i> 61 cm (IV - VII - Villabcd)		Brosme <i>Brosme brosme</i> 50 cm (I - II - IV - Vb - VIa - VII)
	Cardine à 4 tâches <i>Lepidorhombus bosci</i> 28 cm (IVa - VIab - VIIIc)		Cardine franche <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> 28 cm (IVa - VIab - VIIIc)
	Chinchard commun <i>Trachurus trachurus</i> 20 cm (IVa - Villabceghijk - VIII)		Congre* <i>Conger conger</i> 75 cm (IV - Vile) jusque mai
	Coquille St-Jacques <i>Pecten maximus</i> 11 cm (Vilde) jusque mai selon la réglementation en vigueur		Eglefin <i>Melanogrammus aeglefinus</i> 46 cm (IV - VIa - VIIa)
	Homard européen <i>Homarus gammarus</i> 9,7 cm (Lcéphalothorax) (Vile - Villia)		Langoustine <i>Nephrops norvegicus</i> 9 cm (IVa (FU 7 et 8) - IVb (FU 8) - VIa (FU 11, 12 et 13) - VIIa (FU 15) - VIIgh (20 et 21))
	Lieu noir / Colin <i>Pollachius virens</i> 61 cm (I - II - IIIa - IV - Vb - VI)		Limande <i>Limanda limanda</i> 23 cm (IIla - IV)
	Limande sole <i>Microstomus kitt</i> 20 cm (IIla - IV - Vlla)		Lingue bleue <i>Molva dypterygia</i> 88 cm (Vb - VI - VII)
	Merlu <i>Merluccius merluccius</i> 50 cm (IIla - IV - VI - VII - Villabcd)		Mulet lippu* <i>Chelon labrosus</i> 35 cm (IV - Vlld à h - VIII) à partir d'avril
	Sole commune <i>Solea solea</i> 28 cm (IV - Vilefg - Villab) à partir de mai		

Façade Manche / Mer du Nord

	Flet commun* <i>Platichthys flesus</i> 30 cm (IIla - IV) à partir de mai		Hareng <i>Clupea harengus</i> 24 cm (I - II - V - VIaSW - VIIaN - VIIbc)
	Merlan <i>Merlangius merlangus</i> 27 cm (IV - Vlld)		Plie / Carrelet <i>Pleuronectes platessa</i> 40 cm (IV - Villahijk)
	Saint-Pierre* <i>Zeus faber</i> 37 cm (IV - Vilde) jusque mai		Seiche <i>Sepia officinalis</i> 15 cm (L manteau) (Vllegh)
	Sole pole* <i>Pegusa lascaris</i> 22,3 cm (IV - Vilde) jusque avril		Sprat <i>Sprattus sprattus</i> 15 cm (Vilde)
	Tacaud* <i>Trisopterus luscus</i> 25 cm (IV - Vilde) à partir de mai		Turbot <i>Scophthalmus maximus</i> 41 cm (IIla - IV)
	Vieille* <i>Labrus bergylla</i> 35 cm (IV - Vilde) jusque avril		Vive* <i>Trachinus draco</i> 22 cm (IV - Vilde) jusque avril
	Aster maritime* <i>Triplolium pamponicum</i> (VII) selon les arrêtés en vigueur		Obione faux-pourpier* <i>Halimione portulacoides</i> (VII) selon les arrêtés en vigueur à partir de mai
	Soude* <i>Suaeda maritima</i> (seulement gisements autorisés en Vlld)		

Façade Bretagne / Atlantique

	Amande de mer* <i>Glycymeris glycymeris</i> 6 cm (VIII)		Bonite à dos rayé* <i>Sarda sarda</i> 40 cm (VII - VIII) jusque mai
	Encornet rouge* <i>Illex spp.</i> 12cm (Lmanteau) (Vile à h - VIII)		Espadon <i>Xiphias gladius</i> 212 cm (ANE)
	Etrille* <i>Necora puber</i> 4,5 cm (Vile - Villab) à partir d'avril		Mulet cabot* <i>Mugil cephalus</i> 33 cm (Vile à h - VIII)
	Pageot acarné* <i>Pagellus acarne</i> 15,6 cm (Vile à h - VIII)		Palourde japonaise* <i>Ruditapes philippinarum</i> 4 cm (Vile - Villab) selon les arrêtés
	Poulpe de roche <i>Octopus vulgaris</i> 14,5 cm (L manteau) (VIII)		Dulse* <i>Palmaria palmata</i> 25 cm (Villab) à partir d'avril
	Haricot de mer* <i>Himantalia elongata</i> 80 cm (Villab)		Kombu royal* <i>Laminaria saccharina</i> 150 cm (Villab)
	Laitue de mer* <i>Ulva lactuca</i> (Villab)		Nori* <i>Porphyra umbilicalis</i> 25 cm (Villab)

* Espèce ne faisant pas l'objet d'une évaluation scientifique

Espèces pêchées en Méditerranée

	Barbue* <i>Scophthalmus rhombus</i> 41 cm (GSA 7 et 8)		Cardine franche* <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> 27 cm (GSA 7 et 8) à partir de mai
	Crabe bleu* <i>Callinectes sapidus</i> (GSA 7 et 8)		Crevette rose du large* <i>Parapenaeus longirostris</i> 2,4 cm (Lcéphalothorax) (GSA 7 et 8) jusque mai
	Encornet rouge* <i>Illex coindettii</i> 15 cm (L manteau) (GSA 7 et 8)		Flet commun* <i>Platichthys flesus</i> 23 cm (GSA 7 et 8) à partir de mai
	Grondin perlon* <i>Chelidonichthys lucerna</i> 20 cm (GSA 7 et 8)		Homard* <i>Homarus gammarus</i> 11 cm (Lcéphalothorax) (GSA 7 et 8)
	Maquereau espagnol* <i>Scomber japonicus</i> 26 cm (GSA 7 et 8) jusque mai		Pageot acarné* <i>Pagellus acarne</i> 18 cm (GSA 7 et 8) jusque mai
	Poulpe de roche* <i>Octopus vulgaris</i> 15,5 cm (L manteau) (GSA 7 et 8)		Rouget de vase <i>Mullus barbatus</i> 14 cm (GSA 7)
	Sar à museau pointu* <i>Diplodus puntazzo</i> 18 cm (GSA 7 et 8)		Sar commun* <i>Diplodus sargus</i> 23 cm (GSA 7 et 8) jusque mai
	Seiche* <i>Sepia officinalis</i> 19,4 cm (L manteau) (GSA 7 et 8)		Serran chèvre* <i>Serranus cabrilla</i> 15 cm (GSA 7 et 8)
	Tassergal* <i>Pomatomus saltatrix</i> 39 cm (GSA 7 et 8) jusque mai		



Suivez Mr.Goodfish !

Scannez le QR code et accédez
à l'application Mr.Goodfish
et ses réseaux sociaux

