

The background features a vibrant, stylized illustration of various marine organisms. In the upper left, there is a pink, branching coral-like structure. To its right is a pink, teardrop-shaped organism with a blue center. Further right is a large, blue, fan-like structure. Below these, there are more blue and pink branching forms, and at the bottom right, a pink, fan-like structure. The entire scene is set against a white background.

**Morze
Północne**

**Ocean
Atlantycki**

Z uwagi na zmianę klimatu woda w oceanach staje się coraz bardziej kwaśna.

W rezultacie zmniejsza się ilość **węglanów** w wodzie. Hodowcy ostryg zauważyli, że stan ten powoduje tworzenie się słabszych muszli u młodych przedstawicieli gatunku, co sprawia, że są bardziej wrażliwe.

- 1** Zachęcasz hodowców do sadzenia brunatnic — glonów, które zmniejszają kwasowość wód.
- 2** Rozpoczynasz współpracę z naukowcami, którzy mają pomóc wyodrębnić bardziej odporne odmiany ostryg, które lepiej poradzą sobie w zakwaszonej wodzie.
- 3** Zachęcasz hodowców do sprawdzania parametrów wody i dodawania do niej naturalnych produktów, takich jak pokruszone skorupy czy wapienie, które mogą przywrócić zdrowsze pH wody.

